

INCIDENTI DENTALI

Denti permanenti

Attenzione:

più rapido è l'intervento più favorevole è la prognosi per i denti gravemente traumatizzati: al **massimo 2 ore**.

1. Corone fratturate



Quanto più è grande la parte fratturata, tanto più è **urgente** una consultazione presso il medico dentista. Se possibile portare anche i frammenti del dente.

2. Denti vacillanti e spostati



Cura **urgente**: il dente deve essere rimesso al posto giusto il più presto possibile ed eventualmente fissato in questa posizione.

3. Denti spinti dentro l'osso



Cura **urgente**: il dente deve essere rimesso al posto giusto ed eventualmente fissato in questa posizione.

4. Denti usciti dall'osso



Cura **molto urgente**: in condizioni favorevoli il dente può venir riposto con successo (**massimo 2 ore**).
Prendere il dente dalla parte della corona, sciacquarlo con soluzione fisiologica senza toccare la radice e ripiantarlo nell'alveolo. Non pulire meccanicamente né disinfettare il dente. In caso di dubbi mettere il dente in soluzione fisiologica, nel latte o avvolgerlo in una stoffa bagnata, mai nella carta. Telefonare immediatamente al medico dentista per le cure del caso e la fissazione.

ASSICURAZIONE:

tutti gli incidenti dentali devono essere annunciati **per scritto alla cassa malati** e all'assicurazione complementare competente. Le conseguenze di un trauma sono spesso evidenti solo dopo alcuni anni e la cura può risultare molto più onerosa di quanto sembri al momento dell'incidente.

INCIDENTI DENTALI

Denti di latte

Attenzione:

i traumi ai denti di latte possono causare danni ai denti permanenti non ancora spuntati, quali malformazione della corona o della radice, difetti di crescita ecc.

1. Corone fratturate



Quanto più è grande la parte fratturata, tanto più è **urgente** una consultazione presso il medico dentista.

2. Denti vacillanti



Cura **non urgente**: è indicata una consultazione prudenziale nei giorni seguenti.

3. Denti spostati



Cura **urgente**: il dente deve essere riposizionato o estratto il più presto possibile.

4. Denti spinti dentro l'osso



Cura **non urgente** e non sempre necessaria. Consultare in ogni caso il medico dentista visto il grande pericolo di danni al dente permanente.

5. Denti usciti dall'osso



Cura **non urgente**: generalmente non è necessario ripiantare il dente perso. È indicata una consultazione prudenziale nei giorni seguenti.